

اختلال حرکتی ناشی از داروها

اختلالات حرکتی ناشی از داروها گروهی از اختلالات هستند که به دنبال مصرف داروها ایجاد شده و باعث ناراحتی شدید فرد و در مواردی اختلال در عملکرد وی می گردند. این اختلالات می توانند بصورت حاد (طی ساعت ها - روزها) - تحت حاد (طی هفته ها) و یا تأخیری ایجاد شوند .
انواع مهم این اختلالات شامل :

1) بی قراری حرکتی (Akathisia) : احساس بی قراری (معمولاً در پاها ، ناتوانی در آرام نشستن) طی چند هفته پس از شروع کاهش و یا افزایش داروها ظاهر می شود . که علائم آن بصورت حس اضطراب ، آرام نگرفتن ، عصبی بودن، دائم قدم زدن ، تکان دادن پاها در حالت نشسته و نشستن و ایستادن پیاپی می باشد .

2) انقباض عضلات (Dystonia) : انقباض متناوب غیر ارادی عضلات بصورت گرفتگی که بدنبال شروع ، کاهش یا افزایش داروها ظاهر می شود . علائم آن بصورت گرفتگی فک ، انقباض و کج شدگی گردن ، اشکال در باز کردن یا بستن دهان ، کمانی شدن پشت ، گردش چشم ها به بالا یا پهلو، انقباض در عضلات دست و پا . اگرچه این عارضه دردناک بوده ولی با مراجعه به اورژانس و با درمان دارویی سریعاً برطرف شده و عارضه ای به جا نمی گذارد .



گردآورندگان :

واحد آموزش به بیمار

تاریخ بازنگری : 1402/11/29

کد پمفلت آموزشی: sv015

3) کندی حرکتی (Parkinsonism) : نوعی عارضه حرکتی ناشی از مصرف داروها که با علائم زیر ظاهر می شوند ؛ لرزش دور دهان ، سرازیر شدن آب دهان ، کاهش پلک زدن ، صحبت کردن بصورت یکنواخت و فرم لرزش در زمان استراحت ، سفت شدن اندام ها و گردن و تنه .

4) سندرم نورولپتیک بدخیم (N.M.S) که خود را به صورت تب ، سفتی عضلات ، لرزش و کاهش سطح هوشیاری نشان می دهد .

در صورت ظاهر شدن علائم بالا به بیمارستان مراجعه کنید و یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید :

بیمارستان روانپزشکی سینا جوققان

تلفن همراه : 09134814085

تلفن ثابت : 03833263331

تلفن ثابت : 03833261604

تلفن ثابت : 03833261602

زمستان 1402