

آشنایی با داروی کلوزاپین

بیمارستان روانپزشکی سینا



گردآورندگان: واحد آموزش به بیمار

کدبمفlet: 00/sh/ep/27

تاریخ بازنگری: ۲۵/۳/۱۴۰۵

کلوزاپین یک داروی ضد روانپریشی در روانپزشکی است که اگر چه در بعضی بیماری ها معمولاً استفاده می شود برای درمان اسکیزوفرنی مقاوم به درمان به کار برده می شود. این دارو به بیمارانی داده می شود که طبق استانداردهای درمانی با داروهای دیگر مداوا نشده اند یا مقاومت نشان داده اند و یا عوارض جانبی داروهای دیگر برایشان قابل تحمل نبوده است. معمولاً این دارو هم بر نشانه های مثبت بیماری مانند (توهم و هذیان) و هم نشانه های منفی بیماری مانند (دوری از اجتماع و احساس عدم لذت) اثر درمانی قابل توجهی دارد. درمان با داروی کلوزاپین معمولاً در بیمارستان یا سایر مراکز درمانی شروع می شود و بیمار تحت نظر قرار می گیرد زیرا یکی از عوارض جانبی نادراین دارو کاهش گلبولهای سفید خون میباشد که لازم است قبل از شروع دارو و مصرف منظم آن آزمایش خون انجام شود و گلبول های سفید خون کنترل شود و اگر نتیجه طبیعی بود آنگاه می توان دارو را مصرف نمود و یا به مصرف آن ادامه داد.

در صورت ادامه کلوزاپین در شش ماه اول مصرف کلوزاپین ، آزمایش خون جهت بررسی گلبولهای سفید هر هفته و در شش ماه دوم هر دو هفته و پس از آن هر ماه انجام می گردد .

کلوزاپین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدی نیستند . روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آنها بسیار بیشتر از عوارضش باشد . عوارض جانبی تغییرات فیزیولوژیک ماندگار و دائمی نیستند بلکه به علت حضور فعال ماده در بدن ایجاد شده ، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز می باشد . بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود .

برخی از عوارض جانبی کلوزاپین

این دارو ، کمتر از سایر داروهای ضد روانپریشی موجب عوارض حرکتی (لرزش و سفتی عضلات) می شود . از عوارض این دارو خواب آلودگی ، افزایش بزاق ، سرگیجه ، افزایش ضربان قلب ، کاهش فشارخون ، یبوست ، تهوع ، افزایش وزن ، افزایشتری گلیسیرید ، افزایش قند خون ، تعریق ، خشکی دهان ، بیقراری ، تشنج و کاهش شدید گلبول سفید می باشد . در صورت بروز علائمی از قبیل تب ، زخم گلو ، خستگی . زخم مخاط ، بایستی سریعاً به پزشک اطلاع داده شود.

نکات قابل توجه در مصرف دارو

بدون اجازه پزشک دارو را قطع نکنید زیرا نشانه های بیماری ممکن است عود کند.

کلوزاپین در بیماران مبتلا به تشنج کنترل نشده ، بیماران مبتلا به برخی بیماری های خونی و بیمارانی که دچار کاهش شدید گلبول سفید در اثر مصرف قبلی دارو شده اند ، نبایستی مصرف شود . و در اختلال کبدی و اختلالات دستگاه قلبی و عروقی باید احتیاط مصرف شود .

از نوشیدن الکل پرهیزید . الکل خواص خواب آلودگی این دارو را افزایش می دهد .

اگر یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض یادآوری آن را بخورید . اگر نوبت بعدی نزدیک است نوبت فراموش شده را رها کنید و به برنامه منظم دارویی تان برگردید ولی میزان مصرف بعدی را بیشتر نکنید .

در زمان مصرف این دارو برای باردار شدن با پزشک مشورت کنید.

در زمان شیردهی ، قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کنید .

از قرار گرفتن طولانی مدت هنگام معرف این دارو در هوای گرم خودداری نمایید و از میزان کافی مایعات استفاده نمایید.

جهت کاهش یبوست از مایعات ، سبزی و میوه به میزان کافی استفاده نمایید و تحرک و فعالیت های ورزشی خود افزایش دهید .

بیمارستان روانپزشکی سینا جونیان

تلفن همراه :

09134814085

تلفن ثابت :

03833263331

تلفن ثابت :

03833261604

تلفن ثابت :

03833261602

بهار 1405